HYPERTENSIVER NOTFALL - NIFEDIPIN

[c]ABCDE-Herangehensweise + Vorgehen gemäß Leitalgorithmus/ Auswahl und Abfolge der Medikation nach Vorgabe des zuständigen ÄLRD und gem. regionalem Protokoll

RR_{svs} > 220 mmHG oder RR_{dia} > 120 mmHG

Klinisch beschwerdefrei? Hypertensive Blutdrucklage einziges Symptom?

NEIN

Zeichen einer Organdysfunktion?

- Kopfschmerzen
- Augenflimmern
- Übelkeit
- Druck im Kopf, hochroter Kopf

Lungenödem?

Leitalgorithmus Kardiales
Lungenödem

JA

NEIN

JA

Akutes Koronarsyndrom?

Leitalgorithmus Akuter
Thoraxschmerz - ACS

NEIN

Schlaganfall?

→ BEFAST-Test positiv

Algorithmus Schlaganfall nach lokalem Protokoll

NEIN

Bekannte Überempfindlichkeit gegen Nifedipin? Z.n. Myokardinfarkt innerhalb 4 Wochen?

Schwangerschaft/Stillzeit?

NEIN

10 mg Nifedipin Zerbeißkapsel

KEINE Nifedipin-Therapie

Überwachung, kontinuierliches Monitoring + Transport OHNE Notarzt in die Klinik, außer andere Algorithmen fordern eine Notarztnachforderung!