HYPOGLYKÄMIE - ERWACHSENE UND KINDER > 50 KG

[c]ABCDE-Herangehensweise + Vorgehen gemäß Leitalgorithmus

Blutzucker-Messung

Anzeichen einer Hypoglykämie?

Bewusstsein getrübt (GCS < 15 Punkte)?

i.v.-Zugang legen (sichere Rücklaufprobe und schnell laufende Vollelektrolytlösung)

JA

Patient kann sicher Flüssigkeiten schlucken?

NEIN

Langsame Gabe von 100 ml Glucose 20% intravenös (= 20 g) Orale Gabe von 100 ml Glucose 20% oder Substitution per os (= 20 g)

Kontrolle des Blutzuckers aus kapillärem Blut nach 3 Minuten

Ansprechen auf die Therapie?

NEIN

Gabe von 20 ml Glucose 20% intravenös (= 4 g)

Transport unter Monitoring ohne Notarzt in die Klinik durchführen (Behandlung vor Ort nur durch Notarzt möglich)

JA

Notarztnachforderung

Suche nach anderen Ursachen für die Bewusstseinsstörung! z.B. Apoplex (BEFAST), Trauma, Intoxikation, Infekt, Krampfanfall

Transport unter Monitoring vorbereiten

Weitere Maßnahmen It. entsprechender VFA